





ABS. L81.145(1-2)




THE A. ELDRIDGE MINT.









WILLIAM CULLEN, M.D.

*late Professor of Medicine
at Edinburgh.*

Dr Anderson M. D.
Surgeon
1823

SYNOPSIS
NOSOLOGIÆ METHODICÆ
EXHIBENS
SYSTEMA NOSOLOGICUM.

AUCTORE
GULIELMO CULLEN, M. D.
ET NUPER IN ACAD. EDIN. MED. PRACT. PROF.
ET MEDICO REGIO APUD SCOTOS PRIMARIO,
&c. &c.

EDITIO NOVA,
IN CONCINNIOREM ET COMPRESSIOREM FORMAM
REDACTA.

IN USUM TIRONUM

LONDINI :
VENEUNT APUD E. COX FILIUMQUE ST. THOMAS'S
STREET, SOUTHWARK ;
ET JOHANNES COX, Berne's Street, Middlesex Hospital.

1823.

NATIONAL LIBRARY OF
SCOTLAND



SCOTIA

1901

1925

EDITORIS PRÆFATIO.

Cum jam tot editiones hujus operis in lucem prodierunt, harum numero alterum adjicere penitus supervacuum forsitan videatur. At quoniam parvula editio vernaculo sermone scripta nuper exierit, quæ a studiosis in medicina, quorum in usum compilata videtur, benigniter excepta est; plurimi jam desiderati sunt similem editionem ipsis clarissimi auctoris verbis ornatam possidere. Hoc consilio Nosologiæ Culleni textum verbatim argumentis notisque omnibus omissis possuimus; et libellum in eorum usum ita accommodatum, in manus studiosæ juventutis tradimus, non sine spe, nostram quoque parvulam editionem æque benignitur ac altera prædicta fuit exceptam iri,

LONDINI,
Pridie Calend. Aprilis,
MDCCLXIII.

SERIES

CLASSICUM ET ORDINUM

CLASSIS I. PYREXIÆ.

- ORD. I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATA.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

- ORD. I. COMATA.
II. ADYNAZIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIAE.

CL. III. CACHEXIÆ

- ORD. I. MARCORES.
II. INTUMESCENTIAE.
III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

- ORD. I. DYSÆSTHESIÆ.
II. DYSOREXIÆ
III. DYSCLINESIÆ
IV. APOCENOSSES.
V. EPISCHESSES.
VI. TUMORES.
VII. ECTOPIÆ.
VIII. DIALYSES.
-

TABULA

CLASSIUM, ORDINUM, ET GENERUM.

CL. I. PYREXIÆ.

ORD. I. FEBRES.

§ 1	<i>Intermittentes.</i>	§ 2	<i>Continuae.</i>
1	Tertiana.	4	Synocha.
2	Quartana.	5	Typhus.
3	Quotidiana.	6	Synochus.

ORD. II. PHLEGMASIAE.

7	Phlogosis.	16	Hepatitis.
8	Ophthalmia.	17	Splenitis.
9	Phrenitis.	18	Nephritis.
10	Cynanche.	19	Cystitis.
11	Pneumonia.	20	Hysteritis.
12	Carditis.	21	Rheumatism ^{11, \$.} .
13	Peritonitis.	22	Odontalgia.
14	Gastritis.	23	Podagra.
15	Enteritis.	24	Arthropuosis.

ORD. III. EXANTHEMATA.

- | | |
|----------------|----------------|
| 25 Variola. | 30 Erysipelas. |
| 26 Varicella. | 31 Miliaria. |
| 27 Rubeola. | 32 Urticaria. |
| 28 Scarlatina. | 33 Pemphigus. |
| 29 Pestis. | 34 Aptha. |

ORD. IV. HÆMORRHAGIÆ.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 35 Epistaxis. | 37 Hæmorrhois. |
| 36 Hæmoptysis. | 38 Menorrhagia. |

ORD. V. PROFLUVIA.

- | | |
|---------------|----------------|
| 39 Catarthus. | 40 Dysenteria. |
|---------------|----------------|
-

CL. II. NEURSOES.

ORD. I. COMATA.

- | | |
|---------------|---------------|
| 41 Apoplexia. | 42 Paralysis. |
|---------------|---------------|

ORD. II. ADYNAMIAE.

- | | |
|---------------|-------------------|
| 43 Syncope. | 45 Hipochondrias. |
| 44 Dyspepsia. | 46 Chlorosis. |

ORD. III. SPASMI.

- | | |
|---------------|----------------|
| 47 Tetanus. | 52 Palpitatio. |
| 48 Convulsio. | 53 Asthma. |
| 49 Chorea | 54 Dyspnœa |
| 50 Raphania. | 55 Pertusis. |
| 51 Epilepsia. | 56 Pyrosis. |

- | | |
|---------------|----------------|
| 57 Colica. | 60 Diabetes. |
| 58 Cholera. | 61 Hysteria. |
| 59 Diarrhoea. | 62 Hydrophobia |

ORD. IV. VESANIAE.

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 63 Amentia. | 65 Mania. |
| 64 Melancholia. | 66 Oneirophobia <i>dynamia</i> |
-

CL. III. CACHEXIAE.

ORD. I MARCORES.

- | | |
|-----------|---------------|
| 67 Tabes. | 68 Atrophyia. |
|-----------|---------------|

ORD. II. INTUMESCENTIAE.

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| § 1 <i>Adiposæ</i> | 74 Hydrocephalus |
| 69 Polysarcia. | 75 Hydrorachitis. |
| § 2 <i>Flatuosæ</i> | 76 Hydrothorax. |
| 70 Pneumatosis. | 75 Ascites. |
| 71 Tympanites. | 78 Hydrometra. |
| <i>72 Physcomelra</i> | 79 Hydrocele. |
| § 3 <i>Aquilia</i> . | § 4 <i>Solidæ</i> . |
| 73 Anasarca. | 80 Physconia. |
| | 81 Rachitis. |

ORD. III. IMPETIGINES.

- | | |
|-------------------|----------------|
| 82 Scrophula. | 86 Lepra. |
| 63 Syphilis. | 87 Framboesia. |
| 84 Scorbutus. | 88 Trichoma. |
| 85 Elephantiasis. | 89 Icterus. |

CL. IV. LOCALES.

ORD. I. DYSÆSTHESIÆ

90 Caligo	95 Paracusis.
91 Amaurosis.	96 Anosmia.
92 Dysopia	97 Agheustia.
93 Pseudoblepsis.	98 A næsthesia.

ORD. II. DYSOREXIÆ.

§ 1 <i>Appetitus Erronei.</i>	104 Nostalgia.
99 Bulimia.	
100 Polydipsia.	§ 2 <i>Appetitus Deficientie</i>
101 Pica.	105 Anorexia.
102 Satyriasis.	106 Adipsia.
103 Nymphomania.	107 Anaphrodisia.

ORD. III. DYSCINESIÆ.

108 Aphonya.	112 Strabismus.
109 Mutitas.	113 Dysphagia.
110 Paraphonia.	114 Contractura.
111 Psellismus.	

ORD. IV. APOCENOSES.

115 Profusio-	118 Ptyalismus.
116 Epidrosis.	119 Enuresis.
117 Ephiphora.	120 Gonorrhœa.

ORD. V. EPISCHESES.

121 Obstipatio.	124 Dyspermatismus.
122 Ischuria.	125 Amenorrhœa.
123 Dysuria.	

ORD. VI. TUMORES.


36 Aneurisma.	133 Verruca.
37 Varix.	134 Clavus.
38 Ecchymoma.	135 Lupia.
39 Schirrus.	136 Ganglion.
40 Cancer.	137 Hydatis.
31 Bubo	138 Hydarthrus.
32 Sarcoma.	139 Exostosis.

ORD. VII. ECTOPIÆ.

40 Hernia.	142 Luxatio.
41 Prolapsus.	

ORD. VIII. DYALYSES.

43 Vulnus.	147 Psora.
44 Ulcus.	148 Fractura.
45 Herpes.	149 Caries.
46 Tinea.	



NOSOLOGIA CULLENI.

CL. I. PYREXIAE.

Character.—Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones hæsæ, viribus præser-tim artuum imminutis.

ORD. I. FEBRES.

Prægressis languore, lassitudine, et aliis debili-tatis Signis, pyrexia, sine morbo locali prima-rio.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, miasmate paladum ortæ, paroxysmis, pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interpositâ, cum exacerbatione notabili, et plerum-que cum horrore redeuntibus, constantes: Parox-y smo quovis die unico tantum.

GENUS I. TERTIANA.

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum; Accessionibus meridianis.

TERTIANA est vel

1. INTERPOSITA APYREXIA, quæ.
1. Variat paroxysmi duratione.
 - A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.
 - B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.
2. Variat paroxysmorum recursu.
 - C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inæqualibus, alternas similibus.
 - D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.
 - E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.
 - F. Tertiana quotidie revertens, interpositâ remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus, notabili.
4. Variat Symptomatibus.
 - G. Tertiana effectibus soporosis stipata.
 - H. Tertiana spasmis et motibus convulsis stipata.
 - I. Tertiana efflorescentiâ cutis stipata.
 - K. Tertiana phlegmasiâ stipata.
4. Variat aliis morbis complicata.
5. Variat ratione principii.

II. INTERPOSITA REMISSIONE TANTUM.

G. II. QUARTANA:

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum : Accessionibus pomeridianis.

Est vel.

I. INTERPOSITA APYREXIA.

Variat typo.

- A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.
- B. Quartana paroxysmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.
- C. Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.
- D. Quartana quæ ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet, paroxysmis quarto quoque die similibus.
- E. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.
- Variat symptomatibus.*
- Variat aliis morbis complicata.*

II. INTERPOSITA REMISSIONE TANTUM.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circa horarum: Paroxysmatis matutinis.

I. INTERPOSITA APYREXIA.

Variat solitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eâdem horâ matutinâ rediens.

B. Partialis.

Variat comitata.

II. INTERPOSITA REMISSIONE TANTUM.

SECT. II. CONTINUÆ.

bres, sine intermissione, nec miasmate paludum

*ortæ, sed cum remissionibus et exacerbationibus,
parum licet notabilibus, perstantes: Paroxysmi
quovis die binis.*

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus et durus; urina rubra: sensorii functiones parum turbatæ.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata; sensorii functiones plurimum turbatæ; vires multum imminutæ.

Species sunt,

I. *Typhus (petechialis)* plerumque cum petechiis Variat gradu.

1. *Typhus mitior.*

2. *Typhus gravior.*

II. *Typhus (icterodes)* cum flavedine cutis.

G. VI. SYNOCHUS.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et typus composita, initio synocha, progressu et versus fine in typhus.

HECTICA.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis et vespertinis; remissione, rarius apyrexia matutinæ; plerumque sudoribus nocturnis, e urinæ sedimentum surfuraceo-lateritium depонente.

ORD. II. PHLEGMASIÆ.

ebris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul læsâ partis internæ functione; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

G. VII. PHLOGOSIS.

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, et tensio dolens.

Species sunt,

Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abeunte: dolore saepe pulsatili.

1. *Variat formâ.*

2. *Variat sede.*

II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulâ squamulas, in phlyctenâs vel vesiculas abeunte; dolore urente.

1. *Variat vehementiâ.*

2. *Variat causâ remotâ.*

3. *Variat complicata.*

Phlogosis sequelæ sunt.

APOSTEMA.

Post phlegosin, remittentibus dolore et pulsatione tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

GANGRENA.

Post phlegosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.

SPHACELUS.

Post gangrænam pars nigricans, flaccida, facies lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridæ; vitio celeriter serpente.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia; plerumque cum lachrymatione,
Ophthalmiæ species et varietates sunt,

I. IDIOPATHICÆ.

Ophthalmitis membranarum in tunica adnata et ei subjacentibus membranis, sive tunicis oculorum.

A. Variat gradu phlogosis externæ.

B. Variat affectis tunicis internis.

2. *Ophthalmitis (Tarsi) cum tumore, erosione, exudatione glutinosa tarsi palpebrarum.*

II. SYMPTOMATICÆ.

1. *A morbo ipsius oculi.*

2. *A morbis aliarum partium, vel totius corporis.*

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia vehemens; dolor capitis; rubor faciei oculorum, lucis et soni intolerantia; pervigilium delirium ferox vel typhomania.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum austeritate in faucibus sensu.

Species sunt.

I. *Cynanche (tonsillaris) membranam faucium*

cosam, et præcipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.

Cynanche (*maligna*) tonsillas et membranam mucosam mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescens vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre synode et exanthematis.

Cynanche (*trachealis*) respiratione difficili, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synochâ.

Cynanche (*pharyngea*) cum rubore in imis præsertim faucibus; deglutitione maxime difficile, dolentissima; respiratione satis commoda, it febre synocha.

Cynanche (*parotidea*) cum tumore externo earotidum et maxillarum glandularum magno; synocha plerumque leni.

Cynanche *symptomaticæ* sunt.

i. A causis internis.

ii. A causis externis.

G. XI. PNEUMONIA.

rexia; dolor quâdam thoracis parte; respiratio difficultis; tussis.

Species sunt.

Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficile, sæpe non nisi trunco corporis erecto exercendâ; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humidâ, sæpe cruenta.

I. Peripneumonice idiopathicæ simplices.

Variat gradu.

2. Peripneumonice idiopathicæ complicatae febre.

II. Pneumonia (pleuritis) pulso duro; dolore plerumque lateris, pungente, sub inspiratione præsertim aucto; decubitu in latus molestus tussi dolentissimam, initio sicca, postea humidissima cruentâ.

1. Pleuritides idiopathicæ simplices.

2. Pleuritides complicatae.

a. Febre.

b. Catarrho.

3. Pleuritides symptomaticæ.

4. Pleuritides falsæ.

Pneumoniæ sequelæ sunt.

VOMICA.

Post pneumoniam, resolutione quâdam non terminatam, dyspnœa et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

EMPYEMA.

Post pneumoniam suppuratione terminatam, sœpe post vomicam, remissio doloris, dum persistunt dyspnœa, tussis, decubitis difficilis, et febre hectica, sœpe cum sensu liquoris in pectori fluctuantis, et signis hydrothoracis.

G. XII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inæqualis; palpitatione; syncope.

I. IDIOPATHICA.

II. SYMPTOMATICA.

G. XIII. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant, sequentes pro speciebus peritonitis recenseri possent.

I. Peritonitis (*propria*) in peritonæo strictius dicto, sive in peritonæo abdomen intus succingente.

II. Peritonitis (*omentalis*) in peritonæo, per omentum extenso.

III. Peritonitis (*mesenterica*) peritonæo, per mesenterium extenso.

G. XIV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in episgastro ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas et ingesta protinus rejecta; singultus.

I. IDIOPATHICÆ.

I. A causis internis.

A. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto, pyrexia vehementi.

2. A causis externis.

B. Gastritis (*erythematica*) dolore et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente.

II. SYMPTOMATICÆ.

G. XV. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

I. IDIOPATHICÆ.

Species sunt.

1. *Enteritis (phlegmonodœa) dolore acuto, pyrexia vehementi, vomitu et alvo astricta.*
2. *Enteritis (erythematica) dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarhœa.*

II. SPECIES SYMPTOMATICÆ.

G. XVI. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepè pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.

Variat,

- I. Acuta, signis in charactere dictis dignoscenda.
- II. Chronica. Hæc saepè nulla quibus dignoscantur signa, præbet; aliquando tamen eandem adesse suspicari potest, ex hepatitidis causis quibusdam prægressis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a

presso hypochondrio dextro vel a decubitu in latus sinistrum sentito, et denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.

G. XVII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

G. XVIII. NEPHRITIS.

Pyrexia: dolor in regione renis, sœpe ureteris iter sequens; mictio frequens urinæ, vel tenuis de-coloris, vel ruberrimæ; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

Species.

I. IDIOPATHICÆ. Spontanea.

II. SYMPTOMATICÆ.

G. XIX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictiot frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.

Species sunt,

I. A causis internis.

II. A causis externis.

G. XX. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, e dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

G. XXI. RHEUMATISMUS.

Morbus ad externo, et plerumque evidente causa ; pyrexia ; dolor circa articulos, muscularum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, calore externo auctus.

Species indiopathica.

Rheumatismus acutus.

Rheumatismus vulgaris.

Variat sede.

A. In musculis lumborum.

B. In musculis coxendicis.

C. In musculis thoracis.

Rheumatismi sequela est.

ARTHRODYNIA.

Post rheumatismum, nisum violentum, vel subluxationem ; dolores artuum vel muscularum, sub motu præsertim, aucti, plus minusve fugaces, calore lecti, vel alio externo levati ; artus debiles, rigidi, facile et saepe sponte frigescentes ; pyrexia nulla ; tumor plerumque nullus.

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti, sed cum saepius chronicci sint, plerumque ad hunc locum pertinent.

G. XXII. ODONTALGIA.

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum, a carie dentium.

G. XXIII. PODAGRA.

Morbus hæreditarius, oriens sine causa externa

évidente, sed præunte plerumque ventriculi affectione insolitâ; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et sæpe cum ventriculi, vel alsarum internarum partium, affectionibus alternans.

Varietates sunt.

- I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies perstante, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.
 - II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alias partis internæ atonica et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atonæ symptomatis, subito sæpe alternantibus.
 - III. Podagra (*retrogada*) cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alias partis internæ atonia mox insecuta.
 - IV. Podagra (*aberrans*) cum partis internæ inflammatione, vel non prægressâ, vel prægressâ et subito recedente, inflammatione artuum.
- Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

G. XXIV. ARTHROPUOSIS.

Dolores artuum vel partium musculosarum, sæpe post contusionem, frofundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus, vel modicus, et diffsus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hectica, et simul partis apostema.

ORD. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitæ aliquem affidentes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, sæpe plures, exiguae, per cutem sparsæ.

G. XXV. VARIOLA.

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epigastro presso, dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quæ, spatio octo dierum, in suppurationem, et in crustas demum abeunt, sæpe cicatrices depressas, sive foveolas in cute, relinquentes.

Species sunt,

- I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre eruptione factâ protinus cessante.
- II. Variola (*confluens*) pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem perstante.

G. XXVI. VARICELLA.

Synocha.

Papulæ post brevem febriculam erumpentes, in postulas variolæ similes, sed vix in suppurationem, euntes; post paucos dies in squamulas, nullâ cicatrice relictâ, desinentes.

G. XXVII. RUBEOLA.

*Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora,
et tussi sicca, rauca.*

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae
exiguæ, consertæ, vix eminentes, et post tres
dies in squamulas furfuraceas minimas abeun-
tes.

I. *Rubeola (vulgaris) papulis minimis, conflu-
tibus corymbosis, vix eminentibus.*

1. *Symptomatis gravioribus, et decursu minus
regulari.*

2. *Comitante Cynanche.*

3. *Comitante diatheri putridâ.*

II. *Rubeola (variolodes) papulis discretis emi-
nentibus.*

Scotis, the NIRLES.

G. XXVIII. SCARLATINA.

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens :
simul in cute passim rubor floridus, maculis
ampliis, tandem coalescentibus, post tres dies
in squamulas furfuraceas abiens ; superveni-
ente dein saepè anasarca.

Species sunt,

I. *Scarlatina (simplex) nullâ comitante cynanche.*
II. *Scarlatina (cynanchica) cum cynanche ulcerosa.*

G. XXIX. PESTIS.

*Typhus maxime contagiosa, cum summa debili-
tate.*

Incervo morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

G. XXX. ERYSIPelas.

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum somnolentia, saepe cum delirio.

In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogosis *erythema*, G. VII. sp. 2.

Species sunt,

I. Erysipelas (*vesiculosum*) erythematem, rubedine serpente, latum, spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

III. Erysipelas (*phlyctenodes*) erythematem ex papulis pluribus, trunci corporis partes praeципue occupantibus, et protinus in phlyctenas, sive vesiculas parvas, abeuntibus.

G. XXXI. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctionibus cutis.

Incervo morbi die erumpunt papulae, rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

G. XXXII. URTICARIA.

Febris amphimerina.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas rescentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes.

G. XXXIII. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculæ, avellanæ magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

G. XXXIV. APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; linguæ et faucium color purpurascens; escharæ in faucibus et ad linguæ margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretæ, sœpe coalescentes, abrasæ cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi:

Aphtha infantum

ORD. IV. HÆMORRHAGIÆ,

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis appetet.

G. XXXV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

I. IDIOPATHICA.

Variat ratione ætatis.

Epistaxis (juniorum) cum signis plethoræ arteriosæ.

Epistaxis (senum) cum signis plethoræ venosæ.

II. SYMPTOMATICÆ.

1. *A causis internis.*

2. *A causis externis.*

G. XXXVI. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiæ aut dotoris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnœa; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepè spumosum, rejiciens.

Species *idiopathicæ* sunt,

1. *Hæmoptysis (plethoraica)* nullâ vi externâ applicatâ, neque prægressa tussi aut evacuationis solitæ suppressione.
2. *Hæmoptysis (violenta)* a vi externa applicata.
3. *Hæmoptysis (phthisica)* post tussim cum macie et debilitate diuturnam.
4. *Hæmoptysis (calculosa)* rejectis simul moleculis calculus plerumque calcareis.
5. *Hæmoptysis (ricaria)* post evacuationis solitæ suppressionem.

Symptomaticæ sunt,

Hæmoptysis pneumonica.

Hæmoptysis exanthematica.

Hæmoptysis hydropica.

Hæmoptysis cachectica.

Hæmptyseos sequela est.

PHTHISIS.

Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi, febre

hectica, et plerumque expectoratione purulenta.

Species sunt.

I. Phthisis (*incipiens*) sine expectoratione puris.

II. Phthisis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Variat utraque species,

Ratione causæ remotæ,

Variat ratione fontis purulentæ.

G. XXXVII. HÆMORRHOIIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Species sunt,

1. Hæmorrhœis (*tumens*) externa a mariscis.

Variat,

A. Cruenta.

B. Mucosa.

2. Hæmorrhœis (*procidens*) externa a procidentia ani.

3. Hæmorrhœis (*fluens*) interna absque tumore externo, vel procidentia ani.

4. Hæmorrhœis (*cæca*) cum dolore et tumore ani, sine profusione sanguinis.

G. XXXVIII. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina præter ordinem fluxus.

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

- 2. Menorrhagia (*abortūs*) cruenta in gravidis.
 - 3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.
 - 4. Menorrhagia (*ritiorum*) cruenta ex vitio locali.
 - 5. Menorrhagia (*alba*) serosa sine vitio locali in non gravidis.
 - 6. Menorrhagia (*nabothi*) serosa in gravidis.
- Menorrhagiam serosam, sive leucorrhœam ex vitio locali, ad morbos locales referendam esse censeo. Hæmorrhagiæ sequentes plerumque, si non semper, symptomaticæ sunt.

STOMACACE.

Vel scorbuti, vel vitii oris, vel injuriæ externæ, symptoma est.

HÆMATEMESIS.

Plerumque hæmorrhagiæ solitæ vicaria est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi nigri, vel deinde vis externæ, symptoma est.

HÆMATURIA.

Plerumque calculi renalis, aliquando febrium putridarum symptoma est.

CYSTIRRHAGIA.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alias morbi vesicæ, symptoma.

ORD. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretione aucta, naturaliter non sanguinea.

G. XXXIX. CATARRHUS.

Pyrexia sœpe contagiosa, muci, ex glandulis membranæ narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Species sunt:

- Sp. 1. *Catarrhus a frigore.*
- Sp. 2. *Catarrhus a contagio.*

G. XL. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucosæ, vel sanguinolentæ, retentis plerumque fæcibus alvinis; torments; tenesmus.

Variat.

- 1. Vermibus comitata.
 - 2. Rejectis moleculis carnosis, vel sebaceis.
 - 3. Febre intermittente comitata.
 - 4. Sine sanguine.
 - 5. Miliaria comitata.
-

CL. II. NEUROSES.

Sensus et motus læsi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

ORD. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti, cum sopore sive
seusuum feriatione.

G. XLI. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum sopore,
plus minus profundo, superstite motu cordis et
arteriarum.

Apoplexiæ *idiopathicæ* species sunt.

1. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethoræ
universalis, et præcipue capitis.
2. Apoplexia (*serosa*) in corpore, plerumque
senum, leucophlegmatico.
3. Apoplexia (*hydrocephatica*) paulatim ado-
riens; infantes et impuberes, primum lassi-
tudine, febriculâ, et dolore capitis, dein pulsu-
tardiore, pupillæ dilatatione, et sonnolentia
afficiens.
4. Apoplexia (*atrabilioria*) in copore melan-
cholico.
5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mecha-
nica, capiti illata.
6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis sedantibus
interne vel externe adhibitis.
7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis,
8. Apoplexia (*cataleptica*) muscularis, sub artuum
a vi externa motu, contractilibus.
9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suf-
focante.

Apoplexia saepe *symptomatica* est,

1. Febris intermittentis.

2. Febris continuæ.
3. Phlegmasiæ.
4. Exanthematis.
5. Hysteriæ.
6. Epilepsiæ.
7. Podagræ.
8. Vermium.
9. Ischuriæ.
10. Scorbuti.

G. XLII. PARALYSIS.

otus voluntarii nonnulli tantum imminent, saepe cum sopore.

Species idiopathicas sunt,

1. Paralysis (*partialis*) quorundam muscularum tantum.
2. Paralysis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris.
3. Variat ratione habitus corporis.
 - a. Hemiplegia in habitu plethorico.
 - b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.
4. Paralysis (*paraplegica*) dimidii corporis transversim sumpti.
4. Paralysis (*renenata*) a potentibus sedantibus externe vel interne adhibitis
1. Species symptomaticas sunt.

remoretia, utpote semper symptomaticum, in numerum generum recipere nolle; species autem a Sauvagesio recensitas, prout mihi vel Astheniæ vel Paralysios, vel convulsionis symptoma esse videntur, hic subjungam.

TREMOR.

Artus alterna peritus et redditus frequentes moti-
tatio.

1. Species asthenicæ.
 2. Species paralyticæ.
 3. Species convulsivæ.
-

ORD. II. ADYNAMIÆ.

Motus involuntarii, sive vitales sive naturales
imminuti.

G. XLIII. SYNCOPÆ.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quies-
cens,

I. *Idiopathicæ.*

1. Syncope (*cardiaca*) sine causa manifesta sæpe
rediens, cum palpitatione cordis vehementi
in intervallis: *Ex vitio cordis vel rasorum vici-
norum.*
 2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta
oriens: *Ex affectione totius systematis.*
- II. *Symptomaticæ*, sive symptomata morborum
vel totius systematis, vel aliarum præter cor-
partium.

G. XLIV. DYSPEPSIA.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora saltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium, morbo.

I. IDIOPATHICÆ.

II. SYMPTOMATICÆ.

1. A morbo ipsius ventriculi.
2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

G. XLV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu, ex causis non æquis, in temperamento melancholico.

G. XLVI. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentæ desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venæ minus plenæ, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum retentio.

ORD. III. SPASMI.

Muscularum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

SECT. I. IN FUNCTIONIBUS ANIMALIBUS.

G. XLVII. TETANUS.

Plurium muscularum rigiditas spastica.

Variat gradu

I. Tetanus.

Dimidium vel totum corpus spasmis affectum

Variat autem ratione cause remotæ, quatenus

nimirum vel a causa interna, vel a frigore

vel a vulnere oriatur.

Variat etiam quâvis causâ ortus ratione partis corporis affectæ.

II. Trismus. Præcipue maxillæ inferioris Spastica rigiditas.

Species sunt,

a. Trismus (*nascentius*) infantes intra duas primas a nativitate septimanas corripiens.

b. Trismus (*traumaticus*) omnium ætatum a vulnere vel frigore.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Muscularum contractio clonica, abnormis, citrino soporem.

IDIOPATHICÆ.

II. SYMPTOMATICÆ.

G. XLIX. CHOREA.

Impuberis utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum etatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii plerumque alterius lateris, in brachiorum e

manuum motu, histriorum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

G. L. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum agitacione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

G. LI. EPILEPSIA.

Muscularum convulsio cum sopore.

Species *idiopathicæ* sunt.

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adorans; prægressa nullâ sensatione molestâ, nisi fortassis vertiginis vel scotomise alicujus.
2. Epilepsia (*sympathica*) sine causa manifesta; sed prægressa sensatione aurae cujusdam à parte corporis quadam versus caput assurgentis.
3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans.
Variat pro diversitate irritamenti, et hinc.
 - a. Ab injuria capiti illata.
 - b. A dolore.
 - c. A vermis.
 - d. A veneno.
 - e. A scabie, vel alia acris humoris effusione retropulsa.
 - f. A cruditate ventriculi.
 - g. A pathemate mentis.
 - h. Ab haemorrhagia nimia.
 - i. A debilitate.

SECT. II. IN FUNCTIONIBUS VITALIBUS.

A. In actione cordis.

G. LII. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio (*cardiaca*) fere constans, saltem saepe rediens, sine alio morbo evidente.

B. In actione pulmonum.

G. LIII. ASTHMA.

Spirandi difficultas per intervalla subiens; cum angustia in pectore sensu, et respiratione cum sibili strepente: tussis sub initio puroxysmi difficilis, vel nulla, versus fluem libera, cum sputo muci saepe copioso.

a. Species *idiopathicæ* sunt,

1. Asthma (*spontanum*) sine causa manifesta, vel alio morbo comitante.
2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie vel alia acris affusione retropulsa.
3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

b. Species *symptomaticæ*.

G. LIV. DYSPNÆA.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustia, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Species *idiopathicæ* sunt,

1. Dyspnoea (*caturrhialis*) cum tussi frequente, mucum visidum copiosum ejiciente.
2. Dyspnoea (*sicca*) cum tussi plerumque sicca.
3. Dyspnoea (*aerea*) a minima quavis temperaturam mutatione accia.
4. Dyspnoea (*terrea*) cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.
5. Dyspnoea (*aquosa*) cum urina parca et cedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.
6. Dyspnoea (*pinguedinosa*) in hominibus valde obesis.
7. Dyspnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus lassis, vel male conformatis.
8. Dyspnoea (*extrinsecus*) a causis externis manifestis.

Dyspnoea species *symptomaticæ* sunt symptomata,

1. Morborum cordis, vel vasorum majorum.
2. Tumoris abdominalis.
3. Variorum morborum.

G. LV. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora, iterata; sœpe vomitus.

SECT. III. IN FUNCTIONIBUS NATURALIBUS.

G. LVI. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquosi plerumque insipidi, aliquando acris, eructata.

SCOTIS, the Water-Brash.

1. Species unica vera.
2. Species symptomaticæ.

G. LVII. COLICA.

Dolor abdominis, præcipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Species idiopathicæ sunt,

1. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasmis muscularum abdominalium.

Variat symptomatis superadditis; hinc,

- a. Colica cum vomitu stercoreis, vel rerum per anum injectarum.

- b. Colica cum inflammatione superveniente.

2. Colica (*pictorum*) præeunte ponderis vel molestia in abdome, præcipue circa umbilicum, sensu: accidente dolore colico, primum levi, non continuo, et præcipue post pastum aucto; tandem graviore et fere perpetuo; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralysin demum abeunte.

Variat ratione causæ remotæ; et hinc

- a. A veneno metallico.

- b. Ab acidis ingestis.

- c. A frigore.

- d. A contusione dorsi.

3. Colica (*stercorea*) in homicibus alvi tardæ, post diuturnam alvi obstipationem.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

5. Colica (*meconialis*) neopbytorum a meconio retento.

6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam intestinalum parte stricturæ, et sæpe ante eam

collecti flatūs cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi fæces paucas liquidas egerente.

7. **Colica (calculosa)** cum duritie in quadam parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Symptomaticae sunt.

G. LVIII. CHOLERA.

Humoris biliosi vomitus ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmata.

a. *Species idiopathicae sunt.*

1. **Cholera (spontanea)** tempestate calidâ, sine causa manifesta aboriens.

2. **Cholera (occidentalis)** a rebus acribus ingestis.

b. *Symptomaticae.*

G. LIX. DIARRHŒA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus, pyrexia nulla primaria.

1. *Species idiopathicae sunt.*

1. **Diarrhoea (erupulosa)** qua stercore naturalibus liquidiora et majori copiâ dejiciuntur.

2. **Diarrhoea (biliosa)** qua fæces flavæ magnâ copiâ dejiciuntur.

3. **Diarhoea (mucosa)** qua, vel ab acribus ingestis, vel a frigore, præcipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

4. **Diarrhoea (cœliaca)** qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

5. Diarrhoea (*licenteria*) qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.
6. Diarrhoea (*hepatirrhœa*) qua materies serosa cruenta, sine dolore dejicitur.

II. *Symptomaticæ.*

G. LX. DIABETES.

Urinæ plerumque præternaturalis, copiæ immodice profusio chronica.

a. Species *idiopathicae* sunt,

1. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris, coloris et saporis mellei.
- II. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpida non dulci.

b. *Symptomaticæ.*

G. LXI. HYSTERIA.

Venit murmur : sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis ibique strangulantis ; sopor ; convulsiones urinæ limpide copia profusa ; animus, ne sponte, varius et mutabilis.

Quatenus specie differat hysteria idiopathica dicere non possum, nec, ut opinor, recte dixi Sauvagesius. Species enim ab eo recensitæ non nisi ratione cause remotæ, variætates esse nihil videuntur. Ita habet,

- A. Ab emansione mensium.
- B. A menorrhagia cruenta.
- C. A menorrhagia serosa, sive fluore albo.
- D. A viscerum obstructione.
- E. A vitio stomachi.
- F. A salacitate nimia.

symptomatica.

G. LXII. HYDROPHOBIA.

otionis cuiuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem crientis, fastidium et horror; plerumque ex morsu animalis rabidi.

pecies sunt,

- I. Hydrophobia (*rabiosa*) cum mordendi cupiditate, ex morsu animalis rabidi.
 - II. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mordendi cupiditate.
-

ORD. IV. VESINLÆ.

Sentis judicantis functiones læsæ sine pyrexia vel comate.

G. LXIII. AMENTIA.

Ientis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscuntur.

pecies sunt,

- I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.
- II. Amentia (*senilis*) ex perceptione et memoria, ingravescente ætate, immutis.
- III. Amentia (*acquisita*) a causis externis evidenter hominibus sanæ mentis superveniens

G. LXIV. MELANCHOLIA.

Insania partialis sine dyspepsia.

Variat pro varietate rerum de quibus homo delirat.

Ita est,

1. Cum hallucinatione de statu corporis sui a levibus causis periculoso ; vel de statu rerum suarum tristi metuendo.
2. Cum hallucinatione de statu rerum suarum jucundo.
3. Cum amore vehementi sine satyriasi vel nymphomania.
4. Cum superstitione futurorum metu.
5. Cum aversatione motus et omnium vitæ officiorum.
6. Cum inquietudine et statu cuiusvis impotentia.
7. Cum tædio vitæ.
8. Cum hallucinatione de suæ speciei natura.
DÆMONOMANIAM nullam veram esse censeo, enim nostræ sententiæ species sub hoc titulo a SAVAGESIO recensitæ sunt, vel.
1. Species melancholiae sive maniae,
vel 2do. Morbi ab adstantibus ad dæmonum potentiam falsò relati.
- vel 3tio. Morbi omnino simulati.
- vel 4to. Morbi partim veri, ut No. 1, partim simulati ut 3tio. recensiti.

G. LXV. MANIA.

Insania universalis.

1. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate mentis
2. Mania (*Corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis.

3. Mania (*obscura*) prægresso nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.
Maniæ species *symptomaticæ* sunt,
1. Paraphrosyne a venenis.
2. Paraphrosyne febrilis.

G. LXVI. ONEIRODYNIA.

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

1. Oneirodynia (*actira*) excitans ad ambulationem, et motus varios.
 2. Oneirodynia (*gravans*) ex sensu ponderi alicujus incumbentis, et pectus præcipu comprimentis.
-

CL. III. CACHEXIÆ.

otius vel magnæ partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

ORD. I. MARCORES.

corporis totius macies.

G. LXVII. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica:

species sunt,

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica.
Variat sede.
2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.
3. Tabes (*penenata*) a veneno ingesto.

G. LXVIII. ATROPHIA.

Marcor et asthenia, sine pyrexia hectica.

Species sunt,

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione nimia.
 2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento deficiente.
 3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.
 4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, prægressâ nullâ vel evacuatione nimiâ vel cacochymiâ.
-

ORD. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.

SECT. I. ADIPOSÆ.

G. LXIX. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescentia molesta.

Species unica.

SECT. II. FLATUOSÆ.

G. LXX. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescentia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Species sunt,

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa manifesta.
2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere thoracis.

3. Pneumatosis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.
4. Pneumatosis (*hysterica*) cum hysteria.

G. LXXI. TYMPANITES.

Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; cæterarum partium macies.
Species sunt,

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominalis sepe inæquali, et cum rejectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.
2. Tympanites (*abdominalis*) cum resonitu evidentiore, tumore magis æquabili, et emissione flatuum rariori et minus levante.

G. LXXII. PHYSOMETRA.

Fumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Secr. III. AQUOSÆ, sive HYDROPS.

G. LXXIII. ANASARCA.

Corporis totius vel partis ejus intumescentia mollius, inelasticæ.

Species sunt,

1. Anasarca (*serosa*) a retento sero ob evacuationes solitas suppressas, vel ab aucto sero ob ingestam aquam nimiam.
2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

3. Anasarca (*exanthematica*) post exanthemate,
et præcipue post erysipelas, suborta.
4. Anasarca (*anæmia*) a tenuitate sanguinis
per hæmorrhagiam producta.
5. Anasarca (*debilium*) in debilibus a morbis
longis, vel ab aliis causis.

G. LXXIV. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescentia mollis, inelasticæ, hiantibus cranii suturis.
Species unica.

G. LXXV. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis, exiguis,
hiantibus vertebris.

G. LXXVI. HYDROTHORAX.

Dyspnœa; faciei pallor; pedum œdemata; urina
parca; decubitus difficilis; subita et spontanea
ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in
pectore fluctuans.

G. LXXVII. ASCITES.

Abdominis intumescentia tensa, vix elasticæ, sed
fluctuosa.

Species sunt,

1. Ascites (*abdominalis*) cum tumore totius ab-
dominis æquali, et cum fluctuatione satis
evidente.

Variat ratione causæ.

A. Ab oppilatione viscerum.

B. A debilitate.

C. A tenuitate sanguinis.

Variat etiam ratione liquidi effusi.

2. Ascites (*saccatus*) cum tumore abdominis, saltem initio, partiali, et cum fluctuatione minus evidente.

G. LXXVIII. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor; uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem. Species per externa signa distinguendæ vix dari possunt.

G. LXXIX. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mol-lis, fluctuans, pellucidus.

SECT. IV. SOLIDÆ.

G. LXXX. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

G. LXXXI. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; costæ depresso; abdomen tumidum; cætera marcescentia.

Variat,

1. Simplex sine alio morbo.
 2. Aliis morbis conjuncta.
-
-

ORD. III. IMPETIGINES.

Cachexiæ, cutem et externum corpus præcipue deformantes.

G. LXXXII. SCROPHULA

Glandularum conglobatarum, præsertim in collo, tumores; labium superius et columnæ nasi tumida; facies florida, cutis lævis; tumidum abdomen.

Species sunt,

1. *Scrophula (tulgaris) simplex, externa, permanens.*
2. *Scrophula (mesenterica) simplex, interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominali, et foctore fæcum insolito.*
3. *Scrophula (fugax) simplicissima, et tantum circa collum, plerunque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.*
4. *Scrophula (Americana) cum framboesia conjuncta.*

G. LXXXIII. SYPHILIS.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, præsertim ad marginem capillitii, papulæ co-

rymbosæ, in crustas et in ulcera crustosa abe-
untes; dolores ostocopi; exostoses.

G. LXXXIV. SCORBUTUS.

In regione frigida post victimum putrescentem, sali-
tum, ex animalibus confectum, deficiente simul
materiâ vegetabili recente; asthenia; stoma-
cace; in cute maculæ diversicolores, plerumque
livescentes, præsertim ad pilorum radices.

Variat gradu.

Variat etiam symptomatibus.

G. LXXXV. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa rugosa, aspera,
unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus
anæsthesia; facies tuberibus deformis; vox
rauca et nasalis.

{ G. LXXXVI. LEPROSA.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera,
aliquando subtus humida, pruriginosa.

{ G. LXXXVII. FRAMBŒSIA.

Fungi, mori, vel rubi idæi fructus referentes, in
variis cutis partibus enati.

G. LXXXVIII. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in
cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

G. LXXXIX. ICTERUS.

Flavedo cutis et oculorum, fæces albideæ : urina
obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Species idiopathicæ sunt,

1. Icterus (*calculosus*) cum dolore in regione epigastrica acuto, post pastum aucto, et cum dejectione concretionum biliosarum.
2. Icterus (*spasmodicus*) sine dolore, post morbos spasmodicos et pathemata mentis.
3. Icterus (*hepaticus*) sine dolore, post morbos hepatis.
4. Icterus (*gravidarum*) sub graviditate oriens, et post partum abiens.
5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud diu post natales oriens.

Species symptomaticæ.

CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.

ORD. I. DYSÆSTHESIAE.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum exter-
norum vitio.

G. XC. CALIGO.

Visus imminutus, vel prorsus abolitus, ob repagulum opacum, inter objecta et retinam, oculo ipso vel palpebris inhærens.

Species sunt,

1. Caligo (*lentis*) ob maculam opacam pone pupillam.
2. Caligo (*corneæ*) ob corneam opacam.
3. Caligo (*pupillæ*) ob obstructam pupillam.
4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defectum humoris aquei.
5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhaerens.

G. XCI. AMAUROSIS.

Visus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evidente; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

Species sunt,

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et cum signis congestionis in cerebro.
2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum signis debilitatis.
3. Amaurosis (*spasmodica*) post causas et cum signis spasmi.
4. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto vel applicato.

G. XCII. DYSOPIA.

Visus depravatus, ita ut non nisi certâ luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Species sunt,

1. *Dysopia (tenebrarum)* in qua non nisi in magna luce objecta videntur.
2. *Dysopia (luminis)* in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.
3. *Dysopia (dissitorum)* in qua longè distantia non videntur.
4. *Dysopia (proximorum)* in qua proxima non videntur.
5. *Dysopia (lateralis)* in qua non nisi obliquè posita videntur.

G. XCIII. PSEUDOBLEPSIS.

Visus depravatus, ita ut quæ non existant homosevidere imaginatur, vel quæ existunt aliter videt ac revera se habeant.

Species sunt.

1. *Pseudoblepsis (imaginaria)* in qua quæ non existunt consipi videntur.
2. *Pseudoblepsis (mutans)* in qua objecta revera existentia aliquomodo, mutata apparent.

G. XCIV. DYSECŒA.

Auditus imminutus vel abotus.

Species sunt,

1. *Dysecœa (organica)* ob vitium in organis sonos ad internam aurem transmittentibus.
2. *Dysecœa (atonica)* sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.

G. XCV. PARACUSIS.]

Auditus depravatus

Species sunt,

¶ Paracusis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

¶ ariat,

a. Cum auditu gravi.

b. Cum auditu nimis sensibili.

c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

¶ Paracusis (*imaginaria*) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

G. XCVI. ANOSMIA.

Difactus imminutus vel abolitus.

Species sunt,

1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membrana nares internas investiente.

2. Anosmia (*atonica*) sine vicio membranæ nostrum evidente.

G. XCVII. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel abolitus.

Species sunt,

1. Agheustia (*organica*) ob vitium in membrana linguae, a nervis sapida arcens.

2. Agheustia (*atonica*) sine vicio linguae evidente.

G. XCVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus.

ORD. II. DYSOREXIÆ.

Appetitus erroneus vel deficiens.

SECT. I. APPETITUS ERRONEI.

G. XCIX. BULIMIA.

Appetitus esculentorum majori copiâ quam quod digeri possit.

Species idiopathicæ sunt,

1. *Bulimia (bellum) sine morbo ventricul cibi majorem solitâ copiam appetens.*
2. *Bulimia (syncopalis) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen minitantis.*
3. *Bulimia (emetica) cibum magnâ copiâ appetens, et mox per vomitum rejiciens.*

Species symptomaticæ.

G. C. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solita copiæ potulentorum.

Polydipsia fere semper symptomatica est, e variat tantum pro varietate morborum quo comitatur.

G. CI. PICA.

Desiderium non esculentî ingerendi.

G. CII. SATYRIASIS.

In maribus effrænis veneris cupiditas.

Species sunt,

Satyriasis (juvenilis) cum veneris cupiditate
præter modum vehementi, corpore simul parum
perturbato.

Satyriasis (furens) cum veneris cupiditate
effræni, corpore simul multum perturbato.

G. CIII. NYMPHOMANIA.

a fœminis effræne veneris desiderium.
ymphomanie species unica est, et gradu tantum
varians.

G. CIV. NOSTALGIA.

a absentibus a patria, vehemens eandem revi-
sendi desiderium.

Species sunt,
1. Nostalgia (*simplex*) sine alio morbo.
2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

SECT. II. APPETITUS DEFICIENTES.

G. CV. ANOREXIA.

ppetitus esculentorum deficiens.

Species sunt,
1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculum
gravante.
2. Anorexia (*atomica*) ob tonum fibrarum ventri-
culi amissum.

G. CVI. ADIPSIA.

ppetitus potulentorum suppressio, sive sitis
feriatio.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

*Pro morbo habere nolle; omnemque adipsiam
pro sympathica, sive symptomate morbi cuius-
dam, sensorium commune affientis, habeo
ideoque non ad Locales referendi.*

G. CVII. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

ORD. III. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio

G: CVIII. APHONIA.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syncopena

Species sunt,

1. *Aphonias (gutturalis) a tumefactis faucibus et glottide.*
2. *Aphonias (trachealis) a compressa trachea.*
3. *Aphonias (atonica) a nervis laryngis resectis.*

G. CIX. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Species sunt,

- [1. *Mutitas (organica) ex lingua ablata vel vitiata.*
- 2. *Mutitas (atonica) ex nervis linguae laesia.*

3. Mutitas (*surdorum*) ex surditate congenita,
vel puerilibus annis aborta.

G. CX. PARAPHONIA.

ocis sonus depravatus.

Species sunt,

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in gravorem et ingratum mutatur.
2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.
3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstructas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares sibilante.
4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca obscure, et ingrata.
5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.
6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum paliti et glottidem, sonus inter inspirandum editur.

G. CXI. PSELLISMUS.

erba articulandi vitium.

pecies sunt,

1. Ssellismus (*hesitans*) in quo sermonis verba, praesertim prima, non facile proferuntur, et non nisi prima syllaba saepius repetita.
2. Paellismus (*ringens*) in quo sonus literæ R semper aspiratur, et quasi geminatur.

3. Psellismus (*lallans*) in quo sonus literæ L fit liquidior, vel loco literæ R pronunciatur.
4. Psellismus (*emolliens*) in quo literæ duræ immoliores mutantur, et literæ S multum usurpatur.
5. Psellismus (*balbutiens*) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literæ labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.
6. Psellismus (*acheilos*) in quo literæ labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.
7. Psellismus (*lagostomatum*) in quo, ob divisum palatum, literæ gutturales minus recte proununtiantur.

G. CXII. STRABISMUS.

Oculorum axes optici non convergentes.

Species sunt,

1. Strabismus (*habitualis*) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.
2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi, praeter altero debilitate vel mobilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur.
3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

G. CXIII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine respirationis læsione vel phlegmasia.

G. CXIV. CONTRACTURA.

Artus unius vel plurimum contractio diurna, rigida.

pecies sunt,

Constrictura (*primaria*) a musculis contractis,
rigidis.

- a. A musculis ab inflammatione rigidis.
 - b. A musculis a spasmo rigidis.
 - c. A musculis, ob antagonistas paralyticos,
contractis.
 - d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.
 - . Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.
-

ORD IV. APOCENOSES.

Fluxus sive sanguis, aut humores alii, solito
uberius profluens, sine pyrexia impetuve flui-
dorum aucto,

G. CXV. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

G. CXVI. EPHIDROYSIS.

Sudoris præter naturam evacuatio.

Species idiopathica unica est.

Ephidroses *symptomaticæ* variant, pro varietate
morbi quem comitantur, et simul pro varietate
sudoris eliciti, et quodammodo pro varietate
partis maximè sudantis.

G. CXVII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

a. Idiopathica.

*b. Symptomatica.***G. CXVIII. PTYALISMUS.**

Fluxus salivæ.

a. Idiopathicus.

b. Symptomaticus.

G. CXIX. ENURESIS.

Urinæ a vesica fluxus involuntarius non dolens.

Species sunt,

1. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicæ lædentes.
2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel irritatione vesicæ.

G. CXX. GONORRHœA.

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel absque libidine præter naturam fluxus.

Species sunt,

1. Gonorrhœa (*pura*) in qua, prægresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit.
2. Gonorrhœa (*impura*) in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Hujus sequela est.

*Gonorrhœa (*mucosa*) in qua, post gonorrhœam impurum, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.*

Anglis, a GLEET.

3. Gonorrhœa (*laxorum*) in qua, humor plerum

que pellucidus, sine penis erectione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

1. Gonorrhœa (*dormientium*) in qua liquor seminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex somnio libidinoso, ejicitur.
-

ORD. V. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

G. CXXI. OBSTIPATIO.

Dejectio fæcum nulla vel solita rarior.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidæ sæpe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis Colicæ 1mae, 2dae, 4tæ, vel 7mæ, supra dictæ

G. CXXII. ISCHURIA.

Urinæ suppressio absoluta.

Species sunt,

1. Ischuria (*renalis*) prægresso renum morbo, cum dolore, vel molesto gravitatis sensu, in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Vel pro varietate causæ.

2. Ischuria (*ureterica*) prægresso renum morbo, cum doloris vel molesti sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.
Variat pro varietate causæ.
3. Ischuria (*vesicalis*) cum tumore hypogastrii dolore ad cervicem vesicæ, et frequenti ad mingendum stimulo.
Variat pro varietate causæ.
4. Ischuria (*urethralis*) cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.
Variat pro varietate causæ.

G. CXXIII. DYSURIA.

Dolorifica et quodammodo impedita urinæ emissio,
Species sunt,

1. Dysuria (*ardens*) cum ardore urinæ sine morbo vesicæ evidente.
2. Dysuria (*spasmodica*) a spasio ex aliis partibus cum vesica communicato.
3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus vesicam prementibus.
4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammatis.
5. Dysuria (*irritata*) cum signis calculi vesicalis.
6. Dysuria (*mucosa*) cum excretione muci copiosa.

G. CXXIV. DYSPERMATISMUS.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Species sunt,

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urether.
2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum.
3. Dyspermatismus (*præputialis*) ab augustiori præputii orificio.
4. Dyspermatismus (*mucosus*) a muco urethram infarciente.
5. Dyspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione.
6. Dyspermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente.
7. Dyspermatismus (*apractodes*) a genitalium ignavia.
8. Dyspermatismus (*refluxus*) in qua nulla seminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam.

G. CXXV. AMENORRHœA.

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciores, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Species sunt,

1. Amenorrhœa (*emansionis*) in puberibus quibus post fluxus, tempore solitum, menses non jam prodierint, et cum simul variæ affectiones morbidæ adsint.
2. Amenorrhœa (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quæ jam fluere solebant, suppressæ sunt.
3. Amenorrhœa (*dificilis*) in qua menses parciunt et cum dolore fluunt.

ORD. VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

G. CXXVI. ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

G. CXXVII. VARIX.

Tumor mollis non pulsans, supra venam.

G. CXXVIII. ECCHYOMOMA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

G. CXXIX. SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulæ, tumor durus, non dolens ægrè suppurans.

G. CXXX. CANCER.

Tumor scirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

G. CXXXI. BUBO.

Glandulæ congregatae tumor suppurans.

G. CXXXII. SARCOMA.

Exuberatio mollis, non dolens.

G. CXXXIII. VERRUCA.

Exuberatio durior, scabra.

G. CXXXIV. CLAVUS.

Cuticulæ crassities dura, lamellata.

G. CXXXV. LUPIA.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis, non dolens.

G. CXXXVI. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini insidens.

G. CXXXVII. HYDATIS.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.


G. CXXXVIII. HYDARTHROUS.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Anglis, a WHITE SWELLING.

G. CXXXIX. EXOSTOSIS.

Tumor durus ossi insidens.

**ORD. VII. ECTOPIÆ.**

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

G. CXL. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

G. CXLI. PROLAPSUS.

Partis mollis ectopia nuda.

G. CXLII. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

ORD. VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

G. CXLIII. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

G. CXLIV. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

G. CXLV. HERPES.

Phlyctenæ vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentia, dysepuleta.

G. CXLVI. TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum ulcuscula humorem, in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

G. CXLVII. PSORA.

Pustulæ et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

G. CXLVIII. FRACTURA.

Ossis partes a cohaesione in magna fragmenta visu solutæ.

G. CXLIX. CARIES..

Ossis exulceratio.

LATIN AND ENGLISH INDEX

A.

	Page
ADIIPSIA	<i>Want of Thirst</i> 61
Agheustia	<i>Want of Taste</i> 59
Amaurosis	<i>Gutta Serena</i> 57
Amentia	<i>Idiotism</i> 47
Amennorrhœa	<i>Stoppage of the Menses</i> 69
Anaphrodisia	<i>Impotence</i> 62
Anasœcia	51
Anæsthesia	59
Aneurisma	<i>Aneurism</i> 73
Anorexia	<i>Had Appetite</i> 61
Anosmia	<i>Loss of Smell</i> 59
Aphonia	<i>Loss of Voice</i> 62
Aphtha	<i>Thrush</i> 31
Apoplexia	<i>Apoplexy</i> 36
Arthropuosis	<i>White Swelling</i> 27
Ascites	52
Asthma	42
Atrophy	<i>Atrophy</i> 50

B.

Bubo	70
Bulimia	<i>Voracious Appetite</i> 60

C.

Caligo	<i>Blindness</i> 57
------------------	-------------------------------

	Page.
Cancer	70
Caries	72
Carditis	<i>Inflammation of the Heart.</i>
Catarrhus	<i>Catarrh</i> 35
Chlorosis	<i>Green Sickness</i> . . . 39
Cholera	45
Chorea	<i>St. Vitus's Dance</i> . . 41
Clavus	<i>Corn</i> 70
Colica	<i>Colic</i> 44
Contractura	<i>Contraction</i> 64
Convulsio	<i>Convulsion</i> 40
Cynanche	<i>Sore Throat</i> 20
Cystitis	<i>Inflammation of the Bladder</i>

D.

Diabetes	56
Diarrhoea	45
Dysenteria	<i>Dysentery</i> 45
Dysecocia	<i>Deafness</i> 58
Dysopia	<i>Bad Sight</i> 57
Dyspepsia	39
Dyspnoea	<i>Difficult Breathing</i> 42
Dysphagia	<i>Difficult Swallowing</i> 64
Dysuria	68
Dyspermatismus	68

E.

Ecchymoma	<i>Blackness</i> 70
Elephantiasis	55

	Page
Enteritis	{ Inflammation of the Bowels
Enuresis	Incontinence of Urine
Ephidrosis	Sweating
Epilepsia	Epilepsy
Epiphora	Flow of Tears
Epistaxis	Bleeding of the Nose
Erysipelas	St. Anthony's Fire
Exostosis	71

F

Fractura	<i>Fracture</i>
Framboesia	53

G

Ganglion	71
Gastritis	{ Inflammation of the Stomach
Gonorrhœa	<i>Clap</i>

H

Hæmoptysis	{ Hæmorrhage from the Lungs
Hæmorrhoids	Hæmorrhoids
Hepatitis	{ Inflammation of the Liver
Hernia	71
Herpes	72

	Page
Hydarthrus	<i>White Swelling</i> 71
Hydatis	<i>Vesicle</i> 71
Hydrocele	53
Hydrocephalus	52
Hydrometra	<i>Water in the Ovarium</i> . 53
Hydrophobia	47
Hydrorachitis	52
Hydrothorax	<i>Water in the Chest</i> . . 52
Hypochondriasis	<i>Low Spirits</i> 30
Hysteria	<i>Hysterics</i> 39
Hysteritis	{ <i>Inflammation of the Womb</i> 25

I

Icterus	<i>Jaundice</i> 56
Ischuria	67

L

Lepra	<i>Leprosy</i> 54
Lupia	71
Luxatio	<i>Luxation</i> 72

M

Mania	<i>Madness</i> 48
Malancholia	<i>Melancholy</i> 48
Menorrhagia	{ <i>Overflow of the monthly Courses</i> 33
Miliaria	<i>Miliary Fever</i> 30
Mutitas	<i>Dumbness</i> 62

Page

N

Nephritis	{ <i>Inflammation of the</i>
	{ <i>Kidney</i>
Nostalgia	<i>Longing for Home</i>
Nymphomania	<i>Incontinence in Women</i>

O

Obstipatio	<i>Costiveness</i>
Odontalgia	<i>Pain in the Jaw</i>
Oneirodynia	<i>Night Mare</i>
Ophthalmia	<i>Sore Eye</i>

P

Palpitatio	
Paralysis	
Paracusis	<i>Wrong Hearing</i>
Paraphonia	<i>Bad Voice</i>
Pemphigus	<i>Vesicular Fever</i>
Pertussis	<i>Hooping Cough</i>
Pestis	<i>Plague</i>
Peritonitis	{ <i>Inflammation of the</i>
	{ <i>Peritoneum</i>
Phlogosis	{ <i>Cutaneous Inflam-</i>
	{ <i>mation</i>
Phrenitis	<i>Phrensy</i>
Physometra	<i>Wind at the Womb</i>
Physcobia	
Pica	<i>Depraved Appetite</i>
Pneumatosis	<i>Emphysema</i>

	Pag
Pneumonia	{ <i>Pneumonic Inflammation</i>
	2
Podagra	<i>Gout</i>
Polydipsia	<i>Thirst</i>
Polysarcia	<i>Corpulency</i>
Profusio	<i>Flow of Blood</i>
Prolapsus	7
Psellismus	<i>Bad Utterance</i>
Pseudoblepsis	<i>False Vision</i>
Psora	<i>Itch</i>
Ptyalismus	<i>Ptyalism</i>
Pyrosis	43

Q

Quartana	<i>Quartan Ague</i>	14
Quotidiana	<i>Quotidian Ague</i>	17

R

Rachitis	<i>Rickets</i>	53
Raphania	41	
Rheumatismus	<i>Rheumatism</i>	26
Rubeola	<i>Measles</i>	29

S

Sarcoma	70
Satyriasis	<i>Incontinence in Men</i>
Scarlatina	<i>Scarlet Fever</i>
Scirrhous	70
Scorbutus	<i>Scurvy</i>
Scrophula	54

	Page
Splenitis	<i>Inflammation of the Spleen</i> 25
Strabismus	<i>Squinting</i> 64
Syncope	<i>Fainting</i> 38
Synocha	<i>Inflammatory Fever</i> . . 18
Synochus	<i>Mixed Fever</i> 18
Syphilis	54

T

Tabes	<i>Wasting</i> 49
Tertiana	<i>Tertian Ague</i> 15
Tetanus	40
Tinea	72
Trichoma	<i>Plica Polonica</i> 55
Tympanites	<i>Tympany</i> 51
Typhus	<i>Putrid Fever</i> 18

U

Ulcus	<i>Ulcer</i> 62
Urticaria	<i>Nettles Rash</i> 30

V

Variola	<i>Small Pox</i> 28
Varicella	<i>Chicken Pox</i> 28
Varix	70
Verruca	<i>Wart</i> 70
Vulnus	<i>Wound</i> 72

*Plummer and Brewis, Printers,
Love Lane, Little Eastcheap.*

